# SollaNotas

N° 29

## Condiciones para hacer un buen destete

La producción porcina actualmente busca destetar los lechones entre los 21 y 28 días de vida, teniendo un peso que oscila entre 6.5 kilos y 8.5 kilos. Esta edad permite un lechón de mayor viabilidad.

### Consideraciones:

Al momento del destete, el lechoncito se ve sometido a gran stress en razón a la serie de cambios que los afectan, entre ellos:

**1.** El lechón pasa de una dieta líquida basada en la leche materna, a una sólida basada en alimento balanceado, ***SOLLA*** recomienda ***PREINICIADOR D.P.*** (Destete precoz).

**2.** De otro lado, el cerdito que viene de estar en compañía de la cerda y demás lechones de su camada al destetarlo empieza a competir con otros cerditos desconocidos, por espacio, calor y alimento.

**3.** Pasa de estar alojado en un espacio conocido (la paridera) a un lugar completamente diferente.

**4.** Debe reconocer el lugar el nuevo hábitat, dónde tienen que encontrar el comedero, el bebedero y la fuente de calor.

***Pasos a seguir:***

***1.*** El área de precebos deberá ser sometida a lavado y desinfección de pisos, paredes, comederos, bebederos y cortinas, mínimo una semana antes de recibir los animales, se debe lavar con agua a presión, jabón detergente acido y finalmente se aplica el desinfectante. Dejar desocupado el lugar sin animales, con el fin de interrumpir los ciclos infecciosos de las diferentes enfermedades.

***2.*** Para evitar el choque térmico por cambio de sitio de alojamiento. El día del destete, se deben tener en el precebo las fuentes de calefacción encendidas, debemos alcanzar una T° de 28°C para lechones destetados a 21 días y de 26°C para lechones destetados a 28 días. Se debe disminuir 2°C por semana hasta llegar a 22°C a los 42 días.

***3.*** Debemos garantizar agua abundante, potable y disponible para los lechones, revisar que estos alcancen a beber. Se debe tener un bebedero por cada 9 a 10 lechones, la altura apropiada es de 20 centímetros. Igualmente revisar mínimo una vez al día su flujo. Se deben drenar los bebederos, sacando el agua estancada en estos el día que llegan los lechones al precebo.

***4.*** La ventilación es otro aspecto importante para el buen crecimiento y desarrollo de los cerdos, a través de ella logramos la remoción de gases contaminantes como monóxido de carbono, acido sulfhídrico y amoniaco. Sin embargo debemos evitar tener corrientes directas de aire, que enfríen los lechones y nos generen problemas respiratorios y entéricos.

**5.** Las fuentes de calor pueden ser eléctricas, a gas, placas térmicas entre otras, debemos revisar permanentemente la altura de estas para que sea la apropiada, de esta forma garantizamos que los lechones estén bien repartidos y activos. La altura de la fuente de calor es la que nos indica la pauta del ambiente de confort del lechón, para ello es fundamental observar cómo se disponen los lechones respecto a la fuente de calor, si el lechón esta amontonado alrededor de la fuente, es que tiene frio, si están muy alejados de la fuente es que están acalorados, en cualquier caso siempre deberá regularse la temperatura.

**6.** Para esta etapa Solla tiene diseñado el siguiente programa de alimentación: ***PREINICIADOR D.P*** por 1 semana, ***PREINICIADOR*** por 3 semanas, ***INICIADOR CHANCHITOS*** se suministra 3 semanas.

**7.** Si utilizamos alimento en forma de papilla, tener muy presente que debe ser preparado con agua de excelente calidad microbiológica, si no cumplimos con esta condición tendremos un alta posibilidad de que se presenten problemas de salud y el consecuente retraso en la obtención del peso objetivo de esta etapa.

**8.** El alimento debe ser suministrado en forma permanente para estimular el consumo, si suministramos alimento en forma de papilla debemos garantizar su frescura y que este siempre disponible.

**9.** Para minimizar el stress y la tensión por espacio se deben tener en cuenta las recomendaciones de la siguiente tabla:

| Tº | PESO VIVO | ESPACIO EN MTS. |
|---|---|---|
| Confort | 25 | 0.25 |
| Confort | 30 | 0.30 |
| Confort | 32 | 0.35 |
| Altas Tº | 25 | 0.27 |
| Altas Tº | 30 | 0.35 |
| Altas Tº | 35 | 0.40 |

***10.*** Es igualmente importante seguir las siguientes recomendaciones de la tabla acerca de Temperatura, velocidad del aire en mts/seg y recambio de aire en segundos según la edad:.

| SEMANA | TEMPERATURA | VELOCIDAD M/SEG | RECAMBIO EN SEG. |
|---|---|---|---|
| 1ª semana | 28º a 26º | 1-1.5 mt/seg | 0.2-0.5 |
| 2ª semana | 26º a 24º | 1-1.5 mt/seg | 0.2-0.6 |
| 3ª semana | 24º a 22º | 1-1.5 mt/seg | 0.2-0.6 |
| 4ª semana | 22º | 0.5-1 mt/seg | 0.5 |

***11.*** Cumpla siempre con el programa de vacunación recomendado por el Médico Veterinario. teniendo en cuenta las precauciones de almacenamiento y conservación de estos biológicos.

***12.*** Llevar registros donde se pueda evaluar el comportamiento permanente de los lotes que pasan por esta área de la producción. Recuerde que ***SOLLA S.A***. suministra a través de sus técnicos dichos registros de manera gratuita.

***13.*** Entrene y reentre al personal, en las diferentes tareas, para que estos no omitan ninguna de las recomendaciones y podamos lograr los objetivos en esta etapa. Es importante que cada nuevo operario al momento del ingresar tenga un periodo de inducción en los procesos de la granja y conozca plenamente sus responsabilidades antes de empezar a ejecutarlas.

***14.*** Permanecer vigilantes de cualquier cambio en el comportamiento de los cerdos, ya sea en el consumo de alimento, o su comportamiento, ya que nos pueden dar indicios de la iniciación de un problema.

**15.** Debemos mantener iluminación permanente, durante todo el tiempo de permanencia en precebo.

**16.** Mantener un estricto control de roedores, mosca, aves, perros y gatos.

## Qué no debemos hacer:

**1.** Mezclar lotes de diferentes procedencias y edades.

**2.** Utilizar las instalaciones sin ningún tipo de aseo, desinfección y descanso.

**3.** Suministro de agua demasiado caliente o muy fría que nos reduzcan el consumo por estas causas.

**4.** Dejar entrar personas extrañas a la granja.

**5.** Que se acumule alimento húmedo y sucio en los comederos.